Revue suisse Zool.	Tome 81	Fasc. 2	p. 487-488	Genève, juin 1974

Un *Georissus* nouveau de Malaisie *(Coleoptera)*

par

J. DELÈVE

avec 3 figures dans le texte

Georissus insolitus n. sp. (fig. 1-3)

Taille: 1,3 mm. Coloration d'un brun foncé. Forme très rétrécie en arrière.

Tête divisée en deux régions par une carène transversale occupant toute la largeur; région située en avant de cette carène en triangle court; en arrière de ce triangle deux fossettes peu profondes, séparées entre elles par une carène longitudinale médiane partant du sommet épaissi de la profonde fossette centrale, celle-ci en forme d'ellipse allongée, limitée de chaque côté par une carène qui rejoint en arrière, près du bord postérieur, une carène flexueuse partant de la carène antérieure transversale; espace compris entre la fossette centrale et cette carène flexueuse creusé de deux fossettes peu profondes, séparées entre elles par une petite carène transverse (fig. 1).

Pronotum environ 1 fois ⅓ plus large au niveau de l'expansion latérale que long (0,66 mm: 0,5 mm). Bord antérieur largement mais faiblement arrondi, à double rebord, l'inférieur peu fortement crénelé. Côtés élargis jusque vers les ⅔ de la longueur où l'expansion latérale se présente sous la forme d'une dent large. Région basse antérieure marquée dans le prolongement des côtés de la fossette ovalaire centrale qui occupe le centre de la région haute, de deux crêtes longitudinales submédianes atteignant le bord antérieur; en outre de chaque côté, plus latéralement, partant du bord antérieur, une carène flexueuse se rapprochant d'abord de la fossette puis s'en écartant pour se diriger finalement obliquement vers l'intérieur et rejoindre ainsi la crête partant de la base de la fossette; région située entre la fossette et la carène flexueuse plus ou moins arrondie, déprimée. De chaque côté, au niveau de la dent latérale, entre cette carène et le bord latéral externe, une gibbosité peu accentuée, garnie de quelques granules (fig. 2).

Elytres environ 1 fois $^3/_5$ plus longs que le pronotum, de la largeur de celui-ci à la base, un peu plus larges ensemble au niveau de l'expansion latérale que longs

(0,83 mm: 0,8 mm); fortement rétrécis et déclives dans leur moitié postérieure. Sur chacun deux lignes de cellules plus larges que longues (du moins avant la partie déclive), ces lignes séparées l'une de l'autre par une côte peu élevée garnie



FIG. 1-2. *Georissus insolitus* n. sp.: (1) tête (2) pronotum × 100 environ.

de tubercules situés à la jonction des cellules; deuxième ligne limitée extérieurement par une côte plus large, sinueuse et relevée, s'étendant sur la longueur des quatre premières cellules; espace compris entre cette côte et le bord latéral tombant presque verticalement, avec un creux plus ou moins arrondi, marqué de quelques gros points. Bord latéral garni de quelques denticules (fig. 3).



Métasternum creusé en son milieu d'une profonde cavité quadrangulaire, plus large que longue, à fond alutacé. Premier arceau ventral séparé du métasternum par une forte carène transversale, divisé en une région antérieure horizontale et une région postérieure oblique séparée de la région précédente par une crête faiblement tuberculée.

FIG. 3. *Georissus insolitus* n. sp.: partie antérieure de l'élytre (schématique), × 100 environ.

Holotype : un exemplaire (sexe indéterminé): Malaisie, Johor, environ de Dohol, Kota Tinggi, 23-VI-1969 (R. Pilet). Fait partie des collections du Muséum de Genève.

Espèce bien caractérisée par la sculpture des élytres qui n'a, à ma connaissance, jamais été signalée chez les autres espèces du genre *Georissus*.

Adresse de l'auteur :
Institut Royal des sciences naturelles
Rue Vautier 31
B-1040 Bruxelles 4